DIAGRAMMES

R. GUITART

## Extenseurs

*Diagrammes*, tome 3 (1980), exp. n° 3, p. G1-G2

<http://www.numdam.org/item?id=DIA_1980__3__A3_0>

© Université Paris 7, UER math., 1980, tous droits réservés.

L'accès aux archives de la revue « Diagrammes » implique l'accord avec les conditions générales d'utilisation (http://www.numdam.org/legal.php). Toute utilisation commerciale ou impression systématique est constitutive d'une infraction pénale. Toute copie ou impression de ce fichier doit contenir la présente mention de copyright.

NUMDAM

*Article numérisé dans le cadre du programme*
*Numérisation de documents anciens mathématiques*
http://www.numdam.org/

Diagrammes, Vol. 3 , 1980.

# EXTENSEURS.


R. Guitart.

Définition. On appelle extenseur dans une catégorie $\underline{C}$ la donnée $(A,E)$ , où $A \in \underline{C}_0$ et où, pour tous $X$ , $Y \in \underline{C}_0$ ,

$$E: (X \xrightarrow[a]{} A \ , \ X \xrightarrow[p]{} Y) \longmapsto E_p a: Y \longrightarrow A \ ,$$

avec les trois conditions:

1. (composabilité) si $\xrightarrow[p]{} \xrightarrow[q]{}$ , alors $E_q E_p a = E_{q.p} a$ ;
2. (ponctualité) si le carré




est un produit fibré, alors $E_p(a).h = E_{p'}(a.h')$;

3. (adjonction) si $\xleftarrow[p]{} \underset{h}{\overset{h'}{\rightleftarrows}} \xrightarrow[q]{}$ satisfait

$p.h'.h = p$ et $q.h.h' = q$ , alors $E_q(a.p.h') = E_q(E_h(a.p))$ .

Théorème. Dans un topos avec axiome du choix, les extenseurs sont précisément les sup-treillis complets .

Esquisse de preuve. Si $\mathcal{P}$ est la monade des parties du topos, un treillis complet est une $\mathcal{P}$-algèbre, et donc un certain foncteur $(Kl\mathcal{P})^{op} \longrightarrow$ Ens . Mais, dans ce cas, $Kl\mathcal{P}$ est isomorphe à $HEL(\mathbb{C}) =: SPAN(\mathbb{C})/\equiv$ , avec

$$(X \xleftarrow[p]{} U \xrightarrow[q]{} Y) \equiv (X \xleftarrow[r]{} V \xrightarrow[s]{} Y)$$

si, et seulement si, il existe $h$ et $h'$ tels que $p.h = r$, $q.h = s$, $r.h' = p$ et $s.h' = q$ (et en fait, pour $\mathbb{C}$ à $\varprojlim$ finies, l'existence d'un adjoint à droite à $\mathbb{C} \longrightarrow \mathrm{REL}(\mathbb{C})$ équivaut à $\mathbb{C}$ topos avec axiome du choix).

N.B.-Ce théorème reste vrai si, dans 2. , "produit fibré" est remplacé par "carré exact".
Inversement, on peut définir les carrés (A,E)-exacts par la condition 2. , pour tout $a$ .

- Dans des catégories autres que des topos, les structures "treillis complet" et "extenseurs" peuvent différer notablement. Par exemple, dans un groupoïde, tout objet a une structure canonique d'extenseur (donnée par $E_p a = a.p^{-1}$) , mais n'a pas obligatoirement de structure de treillis complet.